


<b>명칭</b> Urepearl Plus Lotion10																	
<b>위험 카테고리</b> 카테고리2 의약품																	
<b>특징</b> ●건조성 피부 치료제 ・보습 성분으로서 천연 보습 인자인 요소와 비타민 E(초산토코페롤)가 건조한 피부에 수분을 유지하게 하여 촉촉하고 부드럽게 가꾸어 줍니다. ・가려움증을 억제하는 성분으로서 2종류의 성분을 배합하였습니다. ・넓은 범위에 매끄럽게 퍼지므로 바르기 쉬운 투명 로션 타입입니다.																	
<b>성분 및 분량</b> <b>[성분]</b> 100mL 중에 아래와 같은 성분을 함유하고 있습니다. 요소 10.0g, 리도카인 2.0g, 디펜히드라민염산염 1.0g 첨가물로서 글리세린, 디이소프로필세바케이트, 락트산, 락트산나트륨, 하이드록시프로필셀룰로스, 정제수, 향료, 에탄올을 함유하고 있습니다.	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">상세 정보</th></tr> <tr> <td>판매원</td><td>다이호 약품공업 주식회사</td></tr> <tr> <td>제조 판매원</td><td>오카야마다이호약품주식회사</td></tr> <tr> <td>제형</td><td>로션</td></tr> <tr> <td>포장 단위</td><td>110mL</td></tr> <tr> <td>제조업체 권장 소매 가격</td><td>2,024 엔 (세금 별도1,840 엔)</td></tr> <tr> <td>JAN 코드</td><td>4987117140330</td></tr> <tr> <td>사용 기한</td><td>3년</td></tr> </table>	상세 정보		판매원	다이호 약품공업 주식회사	제조 판매원	오카야마다이호약품주식회사	제형	로션	포장 단위	110mL	제조업체 권장 소매 가격	2,024 엔 (세금 별도1,840 엔)	JAN 코드	4987117140330	사용 기한	3년
상세 정보																	
판매원	다이호 약품공업 주식회사																
제조 판매원	오카야마다이호약품주식회사																
제형	로션																
포장 단위	110mL																
제조업체 권장 소매 가격	2,024 엔 (세금 별도1,840 엔)																
JAN 코드	4987117140330																
사용 기한	3년																
<b>효능 및 효과</b> 가려움증을 수반하는 건조성 피부(노인 및 성인의 건피증, 소아의 건조성 피부)	<b>용법 및 용량</b> 1일 1회~수 회 적당량을 환부에 바릅니다. <b>[용법 및 용량에 관한 주의사항]</b> (1) 눈에 들어가지 않도록 주의하십시오. 만일 눈에 들어간 경우에는 바로 찬물 또는 미지근한 물로 씻어내십시오. 증상이 심한 경우에는 안과 의사의 진찰을 받으십시오. (2) 소아가 사용하는 경우는 보호자의 지도 감독 하에 사용하게 하십시오. (3) 이 약은 외용으로만 사용하십시오. (4) 환부와 환부 주변을 깨끗이 한 후에 사용하십시오. (5) 규정된 용법과 용량을 지켜 주십시오. (6) 화장품이 아니므로 효능 및 효과에서 규정된 환부에만 사용하고 기초 화장 등의 목적으로 얼굴에는 사용하지 마십시오.																
<b>사용상의 주의사항</b> 금기 (지키지 않으면 현재 증상이 악화되거나 부작용이 발생하기 쉬워진다) 다음 부위에는 사용하지 마십시오. (1) 눈 주변, 점막(예를 들어 구강, 비강, 질 등) 등 (2) 염증 또는 상처가 있는 환부 (3) 진무른 곳이나 손 등의 피부가 터서 갈라진 환부																	

신중투여

1. 다음에 해당하는 사람은 사용 전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

(1) 의사의 치료를 받고 있는 사람

(2) 약 등으로 인해 알레르기 증상(예를 들어 발진・발적, 가려움증, 짓무름 등) 또는 자극 증상을 일으킨 적이 있는 사람

2. 사용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중지하고 이 첨부 문서를 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

관련 부위	증상
피부	지트무름, 발진・발적(충혈되어 붉어짐), 가려움증, 자극감(통증, 열감, 따끔거림), 부종, 부스럼이나 딱지처럼 피부가 벗겨

3. 2주간 사용해도 증상이 개선되지 않는 경우는 사용을 중지하고 이 첨부 문서를 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

문의처

이 제제에 관하여 궁금하신 점이 있으시다면 구매하신 가게 혹은 아래 연락처로 문의해 주시기 바랍니다.

판매원

다이호 약품 공업 주식회사 고객상담실

우편번호 101-8444 도쿄도 치요다구 간다니시키초 1-27

전화번호 0120-4527-66

접수시간 9:00 ~ 17:00 (토, 일, 공휴일 제외)

홈페이지 <https://www.taiho.co.jp/>

제조 판매원

오카야마다이호약품주식회사