

명칭 Solmack Q-Arl D

제2류 의약품

지사제

특징

★로페라미드염산염(지사제)과 비오디아스타제 2000(소화효소), 락토민(페카리스균) 등 3개의 유효성분이 설사 증상에 효력을 발휘합니다.
 ★물 없이 먹을 수 있는 츄어블정이므로 설사로 곤란할 때 어디에서든 손쉽게 복용하실 수 있습니다.



<효능·효과>

과식·과음으로 인한 설사, 차게 자서 생기는 설사

<용법·용량>

다음 용량을 씹어서 드시거나 입 안에서 녹여서 복용하시기 바랍니다.

설사가 멈추면 복용하지 마십시오.

복용 간격은 4시간 이상 두십시오.

연령	1회 용량	1일 복용 횟수
성인(15세 이상)	2정	2회
15세 미만	복용하지 마십시오.	

<용법·용량에 관련된 주의>

(1)정해진 용법·용량을 엄수하십시오.

(2) 알약을 꺼내는 법

오른쪽 그림과 같이 정제가 들어가 있는

PTP시트의 튀어 나와있는 부분을 손가락으로

세게 눌러 뒷면의 알루미늄 포일을 찢어서 꺼내어 복용하시기 바랍니다. (잘못해서 그대로 복용하거나 하게 되면 식도점막에 찢리는 등 예기치 못한 사고로 이어집니다)



세부 정보

판매원	다이호 약품공업 주식회사
제조판매원	다이쇼(大昭)제약 주식회사
제형	정제
포장 단위	12정
권장 소비자가격	1,320 엔 (세전 가격 1,200 엔)
JAN 코드	4987117400311
사용기한	3년

<성분·분량과 작용>(1일 용량 중)

성분	분량	작용
로페라미드염산염	1mg	장의 과잉 운동 및 장 점막에서의 수분 흡수·분비 이상을 개선하여 설사를 억제합니다.
비오디아스타제 2000	90mg	위장 안에 있는 미소화물의 소화를 도와줍니다.
락토민(페카리스균)	20mg	유산균(선옥균)이 흐트러진 장내 세균 균형을 맞춰줍니다.

첨가물: D-마니톨, 자이리톨, 결정셀룰로스, 크로스포비돈, 인산수소 칼슘, 유당수화물, 메타규산알루미늄산마그네슘, 스테아르산마그네슘, l-멘톨

보관 및 취급 상의 주의

- (1) 직사광선이 닿지 않는 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하세요.
- (2) 아이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하 주세요.
- (3) 다른 용기에 바꾸지 말아주세요. (오용할 원인이 되거나 품질이 바뀔 수 있습니다)

사용상 주의사항

하지 말 것

(지키지 않으면 현재 증상이 악화되거나 부작용·사고가 나기 쉽습니다)

1. 다음과 같은 사람은 복용하지 마십시오.

이 약 또는 이 약의 성분으로 인해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.

2. 이 약을 복용하고 있는 동안에는 다음과 같은 의약품을 사용하지 마십시오.

위장진통진경제

3. 복용 후 차량 또는 기계류를 운전, 조작하지 마십시오.

(졸음 등이 나타날 수 있습니다)

4. 복용 전후에는 음주를 하지 마십시오.

상담할 것

1. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담을 받으시기 바랍니다.

(1) 의사 치료를 받고 있는 사람.

(2) 발열을 수반하는 설사가 있는 사람, 혈변이 있는 사람 또는 점액변이 계속되는 사람.

(3) 급성인 격렬한 설사 또는 복통·복부팽창·구역질 등의 증상을 수반하는 설사가 있는 사람.

(이 약으로 무리하게 설사를 멈추게 하면 오히려 병을 악화시킬 수 있습니다)

(4) 변비를 피해야 하는 항문 질환 등이 있는 사람.

(이 약을 복용함으로 인해 변비가 생길 수 있습니다)

(5) 임신부 또는 임신이 의심되는 사람.

(6) 수유 중인 사람

(7) 고령자

(8) 약 등으로 인해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.

2. 복용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용 가능성이 있기 때문에 즉시 복용을 중단하고 이 문서를 갖고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담을 받으시기 바랍니다.

관계 부위	증상
피부	발진·발적, 가려움
소화기	변비, 복부팽만감, 복부불쾌감, 구역질, 복통, 구토, 식욕부진
정신신경계	현기증

드물게 아래와 같은 심각한 증상이 발생할 수 있습니다. 그러한 경우 즉시 의사 진료를 받으십시오.

증상 명칭	증상
쇼크 (아나필락시스)	복용 후 바로 피부 가려움, 두드러기, 목 잠김, 채채기, 목 간지러움, 숨 막힘, 두근거림, 의식 혼미 등이 나타남.
피부점막안 증후군 (스티븐슨-존슨증후군) 중독성 표피괴사용해증	고열, 눈 충혈, 눈곱, 입술 진물, 인후통, 피부의 광범위한 발진·발적 등이 지속되거나 급격하게 악화함.
일레우스 증상 (장폐색 증상)	격한 복통, 가스 배출(방귀) 정지, 구토, 복부팽만감을 수반하는 현저한 변비가 나타남.

3. 복용후, 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 지속 또는 심해질 경우에는 복용을 중단하고 이 문서를 갖고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하시기 바랍니다.

졸음

4. 2~3일간 복용하더라도 증상이 나아지지 않을 경우에는 복용을 중단하고 이 문서를 갖고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하시기 바랍니다.

문의처

이 제제에 대해 궁금하신 점이 있으시다면 구입하신 가게 혹은 아래 연락처로 문의해 주시기 바랍니다.

판매원 연락처 다이호 약품 공업 주식회사 고객상담실

〒101-8444 도쿄도 지요다구 간다니시키초 1-27

전화번호 0120-4527-66

접수시간 9:00~17:00(토, 일, 공휴일 제외)

홈페이지 <https://www.taiho.co.jp/>