

使用注意事項

應遵守以下預防措施。

（如果不觀察，可能會加重目前的症狀，更容易發生不良反應和事件。）

1. 以下人員不應服用此藥。

(1) 因本藥或其成分發生過敏反應的人

(2) 男性

(3) 70 歲以上的女性

(4) 15 歲以下兒童

(5) 懷孕或可能懷孕的婦女

(6) 有以下症狀的人：

- 排尿困難，尿瀦留（小便困難，即使需要小便也無法小便）

- 血尿、排尿痛和膀胱痛

(7) 在醫療機構被診斷為下列人員：

- 胃乏力（與胃下垂相關的胃功能降低）、腸乏力（腸蠕動降低）

- 幽門和腸道堵塞

- 帕金森病、腦血管疾病（腦梗塞、腦出血等）

- 青光眼；癱瘓；重症肌無力；嚴重的心髒病

2. 服用此藥時，請勿服用以下任何藥物。

胃止痛/解痙藥；其他含有東莨菪提取物的胃腸道藥物；暈車藥；鼻炎口服藥物；感冒藥

3. 服用此藥後請勿駕駛汽車或操作機器。

（可能會出現嗜睡、視力模糊、異常頭暈等症狀。）

4. 母乳喂養的人不應服用該藥或在服用該藥時避免母乳喂養。

5. 不要長期服用這種藥。

諮詢

1. 以下人員服用本藥前應諮詢醫生或藥劑師。

(1) 正在接受醫生治療的人。

(2) 老年人（65 歲以上）

(3) 因任何藥物而發生過敏反應的人。

(4) 有以下症狀的人：

- 尿頻或尿失禁的急性症狀（發病後 1 個月內）。

- 人們只有夜間尿頻，白天沒有尿頻。

(5) 診斷為心律失常、肝功能障礙、腎功能損害、潰瘍性結腸炎或甲狀腺功能亢進的人。

(6) 有排尿困難、尿瀦留、血尿、排尿痛或膀胱疼痛症狀的人（仍有症狀者不應服用此藥）。

(7) 因子宮癌、直腸癌等接受盆腔手術的人

2. 以下症狀可能是該藥的不良反應。如果服用該藥後出現任何這些症狀，請立即停止使用該藥，並攜帶此文件諮詢您的醫生或藥劑師。

受影響的身體	症狀
皮膚	皮疹/發紅、瘙癢、蕁麻疹
消化器官	食慾不振、噁心/嘔吐、腹痛、消化不良、口腔炎
精神神經症	頭痛、頭暈、虛弱感、麻木、腿無力、步幅縮短、手腳發抖、意識下降和定向障礙
循環器官	心悸、胸悶、血壓升高、脈搏紊亂
泌尿器官	排尿困難和殘留尿感
其他	口齒不清，舌痛，喉嚨痛，聲音嘶啞，味覺障礙，喉嚨有痰，腰痛，眼睛乾澀，異常光亮，水腫，全身不適。

3. 很少，服用該藥後會出現以下嚴重症狀。由於它們可能是不良反應，請立即停止使用該藥物，並使用此文件諮詢醫生。

症狀名稱	症狀
尿瀦留	一種痛苦的情況，患者有小便的衝動但不能小便。
幻覺、譫妄	感覺有些東西實際上並不存在，可能會出現注意力、認知和認知功能的惡化。
急性青光眼發作	可能會出現突然的噁心、眼痛和頭痛、眼睛困難等。
麻痺性腸梗阻 (腸梗阻樣症狀)	出現劇烈腹痛、排氣停止、嘔吐和伴有腹脹感的明顯便秘。
橫紋肌溶解症	可能出現手、腳、肩、腰部肌肉酸痛，手腳麻木，用力不足，僵硬，全身不適，小便呈紅褐色等。
腎功能不全	可能會出現發燒、皮疹、尿量減少、全身水腫、全身不適、關節痛（關節痛）、腹瀉等。
肝功能障礙	可能出現發燒、瘙癢、皮疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身不適、食慾不振等。
血小板減少	由於作為血液成分的血小板數量減少，可能會出現鼻出血、牙齦出血和瘀傷等出血症狀。
皮膚粘膜眼綜合徵 (史蒂文斯-約翰遜綜合症)	高燒、眼睛發紅、風濕、嘴唇糜爛、喉嚨痛、大面積皮膚皮疹/發紅等可能持續存在或迅速惡化。
QT 間期延長；室性心動過速	可能會出現頭暈、心悸、胸痛、心率加快和意識喪失。

4. 服用該藥後可能會出現以下症狀。如果這些症狀中的任何一個持續或增加，請停止使用該藥並使用此文件諮詢您的醫生或藥劑師。

口乾、便秘、腹瀉、嗜睡、眼睛模糊、暫時健忘

5. 如果使用該藥物 2 週後症狀沒有改善，請停止使用該藥物並攜帶此文件諮詢您的醫生或藥劑師。