

品牌名稱： BUP-4 LADY

風險類別

第 1 類醫藥品

特徵

BUP-4 LADY 是一種女性專用藥物，
可控制膀胱異常收縮，
改善尿頻和伴有尿急的尿失禁。

BUP-4 LADY 可以改善因膀胱過度活動症狀而
受損的日常活動。



成分和數量

在 1 片中：
鹽酸丙哌維林..... 10 毫克

添加劑：

乳糖水合物、結晶纖維素、
羧丙基澱粉、羧甲基纖維素鈣、
羧丙甲纖維素、滑石粉、聚乙二醇 6000、
氧化鈦、硬脂酸鎂和巴西棕櫚蠟。

更多信息

製造商和分銷商

大鵬藥品工業股份有限公司

劑型

平板電腦

包裝單位

7 片

建議零售價

2,750 日元 (不含稅 2,500 日元)

一月代碼

4987117614008

截止日期

3 年

劑量和給藥

成年女性 (15 歲及以上和 70 歲以下) 應每天飯後服用一粒。

年齡	單劑量	每 24 小時最大劑量
成年女性 (15 歲以上, 70 歲以下)	1 片	一次
成年女性 (70 歲以上)	別拿	
成年男性 (15 歲及以上)		
小的 兒童 (15 歲以下)		

〈用法用量及注意事項〉

- (1) 嚴格遵守劑量和給藥方法。
- (2) 每次在同一時間服用這種藥。
- (3) 取出藥片的方法：用指尖用力推動 PTP 藥片的突出部分與藥片一起撕開背面的鋁箔，取出藥片。

適應症：

尿急 (無法忍受的小便衝動的抱怨)、尿頻尿急 (尿頻) 和尿失禁

儲存和處理注意事項

- (1) 存放在陰涼潮濕的地方，避免陽光直射。
 - (2) 請將本品放在兒童不能接觸的地方。
 - (3) 請勿用其他容器替換本產品 (導致誤用或改變質量)。
 - (4) 不要服用超過保質期的產品。
- 保質期列在外盒中。

如需查詢，請聯繫您購買產品的商店或以下人員。

聯繫人：大鵬藥品工業股份有限公司客戶關係處
〒101-8444 1-27 1-27, 東京都千代田區神田錦町

電話 0120-4527-66

接待時間 9:00-17:00 (週末及節假日除外)

製造商和分銷商

大鵬藥品工業股份有限公司
1-27 東京都千代田區神田錦町

使用注意事項

應遵守以下預防措施。

(如果不觀察, 可能會加重目前的症狀, 更容易發生不良反應和事件。)

1. 以下人員不應服用此藥。

- (1) 因本藥或其成分發生過敏反應的人
- (2) 男性
- (3) 70 歲以上的女性
- (4) 15 歲以下兒童
- (5) 懷孕或可能懷孕的婦女
- (6) 有以下症狀的人：
 - 排尿困難, 尿瀦留 (小便困難, 即使需要小便也無法小便)
 - 血尿、排尿痛和膀胱痛
- (7) 在醫療機構被診斷為下列人員：
 - 胃乏力 (與胃下垂相關的胃功能降低)、腸乏力 (腸蠕動降低)
 - 幽門和腸道堵塞
 - 帕金森病、腦血管疾病 (腦梗塞、腦出血等)
 - 青光眼; 癡呆; 重症肌無力; 嚴重的心髒病

2. 服用此藥時, 請勿服用以下任何藥物。

胃止痛/解痙藥; 其他含有東莨菪提取物的胃腸道藥物; 暈車藥; 鼻炎口服藥物; 感冒藥

3. 服用此藥後請勿駕駛汽車或操作機器。

(可能會出現嗜睡、視力模糊、異常頭暈等症狀。)

4. 母乳喂養的人不應服用該藥或在服用該藥時避免母乳喂養。

5. 不要長期服用這種藥。

諮詢

1. 以下人員服用本藥前應諮詢醫生或藥劑師。

- (1) 正在接受醫生治療的人。
- (2) 老年人（65 歲以上）
- (3) 因任何藥物而發生過敏反應的人。
- (4) 有以下症狀的人：
 - 尿頻或尿失禁的急性症狀（發病後 1 個月內）。
 - 人們只有夜間尿頻，白天沒有尿頻。
- (5) 診斷為心律失常、肝功能障礙、腎功能損害、潰瘍性結腸炎或甲狀腺功能亢進的人。
- (6) 有排尿困難、尿瀦留、血尿、排尿痛或膀胱疼痛症狀的人（仍有症狀者不應服用此藥）。
- (7) 因子宮癌、直腸癌等接受盆腔手術的人

2. 以下症狀可能是該藥的不良反應。如果服用該藥後出現任何這些症狀，請立即停止使用該藥，並攜帶此文件諮詢您的醫生或藥劑師。

受影響的身體	症狀
皮膚	皮疹/發紅、瘙癢、蕁麻疹
消化器官	食慾不振、噁心/嘔吐、腹痛、消化不良、口腔炎
精神神經症	頭痛、頭暈、虛弱感、麻木、腿無力、步幅縮短、手腳發抖、意識下降和定向障礙
循環器官	心悸、胸悶、血壓升高、脈搏紊亂
泌尿器官	排尿困難和殘留尿感
其他	口齒不清，舌痛，喉嚨痛，聲音嘶啞，味覺障礙，喉嚨有痰，腰痛，眼睛乾澀，異常光亮，水腫，全身不適。

3. 很少，服用該藥後會出現以下嚴重症狀。由於它們可能是不良反應，請立即停止使用該藥物，並使用此文件諮詢醫生。

症狀名稱	症狀
尿瀦留	一種痛苦的情況，患者有小便的衝動但不能小便。
幻覺、譫妄	感覺有些東西實際上並不存在，可能會出現注意力、認知和認知功能的惡化。
急性青光眼發作	可能會出現突然的噁心、眼痛和頭痛、眼睛困難等。
痙攣性腸梗阻 (腸梗阻樣症狀)	出現劇烈腹痛、排氣停止、嘔吐和伴有腹脹感的明顯便秘。
橫紋肌溶解症	可能出現手、腳、肩、腰部肌肉酸痛，手腳麻木，用力不足，僵硬，全身不適，小便呈紅褐色等。
腎功能不全	可能會出現發燒、皮疹、尿量減少、全身水腫、全身不適、關節痛（關節痛）、腹瀉等。
肝功能障礙	可能出現發燒、瘙癢、皮疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身不適、食慾不振等。
血小板減少	由於作為血液成分的血小板數量減少，可能會出現鼻出血、牙齦出血和瘀傷等出血症狀。
皮膚粘膜眼綜合徵 (史蒂文斯-約翰遜綜合症)	高燒、眼睛發紅、風濕、嘴唇糜爛、喉嚨痛、大面積皮膚皮疹/發紅等可能持續存在或迅速惡化。
QT 間期延長；室性心動過速	可能會出現頭暈、心悸、胸痛、心率加快和意識喪失。

4. 服用該藥後可能會出現以下症狀。如果這些症狀中的任何一個持續或增加，請停止使用該藥並使用此文件諮詢您的醫生或藥劑師。

口乾、便秘、腹瀉、嗜睡、眼睛模糊、暫時健忘

5. 如果使用該藥物 2 週後症狀沒有改善，請停止使用該藥物並攜帶此文件諮詢您的醫生或藥劑師。