

名稱 PITAS Cough Troche

風險類別
第 2 類醫藥品
特色

- 含有口腔殺菌成分・十六烷基吡啶氯化物水合物，抑制因喉嚨發炎引起的喉嚨疼痛和腫脹。
- 鎮咳成分・酚酞酸右旋美吐魯番作用于咳嗽中樞，抑制難受的咳嗽。



成分 / 份量 (6 個中)

鄰苯二甲酸右美沙芬 60mg

鄰一甲氧基酚磺酸鉀 140mg

氯化十六烷基吡啶水合物 6mg

添加物：羥丙基纖維素，聚維酮，茁黴多糖，聚乙
烯二醇，L-薄荷醇，單寧酸，D-山梨醣醇，糖精
鈉，蔗糖油酸酯，三氯蔗糖，銅葉綠素鈉，香料

詳細資料

製造總經銷

大鵬藥品工業株式會社

劑型

口含錠

包裝單位

12 粒

製造商的建議零售價

886 日圓
(不含稅 805 日圓)

JAN 碼

45198625

有效期限

3年

用法與用量

將指定劑量放入口中，慢慢溶解，不要咀嚼。

效能與效果

咳嗽

咳痰

喉嚨發炎造成的喉嚨疼痛，喉嚨腫脹，喉嚨沙啞，
喉嚨不舒服感或聲音嘶啞

年齡	1 次量	1 日使用次數	使用間隔
成人 (15 歲以上)	1 粒	6 次	2 小時以上
15 歲以下	不要使用。		

〈用法與用量注意事項〉

- (1) 請嚴格遵照規定的用法與用量。
- (2) 請勿咬碎或直接吞服。

使用須知之禁止事項

(若未遵守，容易造成現有症狀惡化，產生副作用)

1. 以下情況者，請勿使用

曾經因本劑或本劑成分引起過敏症狀者。

2. 使用本劑時，請勿使用以下任一種藥品

其他止咳去痰藥，感冒藥，鎮定劑，含抗組織胺劑內服藥等（鼻炎用內服藥，暈車藥，過敏用藥等）

諮詢事項

1. 以下情況者，請於使用前向醫師，藥劑師或登記經銷商諮詢

(1) 正在接受醫師治療者。

(2) 孕婦或可能懷孕中。

(3) 曾因藥物等而引起過敏症狀者。

(4) 出現以下症狀者：發高燒

2. 使用後，有可能出現以下症狀的副作用，此時立即停用，並攜帶本說明書向醫師，藥劑師或登記經銷商諮詢。

相關部位	皮膚	消化系統	精神神經系統	呼吸道
症狀	出疹，發紅，發癢	噁心，嘔吐，食慾不振	眩暈	呼吸困難，呼吸急促

極少數可能出現以下的嚴重症狀。如出現這些症狀，請立即就醫接受治療。

症狀名稱	症狀
休克 (嚴重過敏反應)	使用後立即出現皮膚發癢，蕁麻疹，聲音嘶啞，打噴嚏，喉嚨發癢， 呼吸困難，心悸，意識模糊等。

3. 使用 5~6 次後症狀仍未改善時，請停用並攜帶本說明書向醫師，藥劑師或登記經銷商諮詢。

保管和處理注意事項

- (1) 保存在陽光直射、濕氣少、涼爽的地方。
- (2) 保管在兒童夠不到的地方。
- (3) 不要更換到其他容器（導致誤用或質量改變）。
- (4) 鋁袋開封后要迅速使用。
- (5) 超過使用期限的產品不要使用。

諮詢處

有關本藥劑的任問題，請聯絡購買的商店或以下方式與我們聯繫。 經銷商

聯絡方式 大鵬藥品工業株式會社 顧客諮詢室

郵遞區號 101-8444 東京都千代田區神田錦町 1-27

電話號碼 0120-4527-66

受理時間 9:00~17:00 (星期六、日、國定假日除外)

官網 <https://www.taiho.co.jp/>