# 名稱 ZENOL DICLODIRECT R

### 風險類別

第2類醫藥品

#### 特徵

【大範圍塗抹肩痛和腰痛患處的大口徑塗膏】 大口徑塗膏藥,可以大範圍,充分地塗抹到肩部 至脖頸。請按住疼痛處和周圍患部進行塗抹。旋 轉底部擠出"藥劑"。請在擠出4~5mm後使用。 雙氯芬酸鈉1.0%配合

# 【方便使用的大口徑塗膏】

充分地塗抹到腰痛和周邊患處。大範圍地塗抹到 手臂和腳部肌肉。



成分 / 份量 100g 中所含

雙氯芬酸鈉 1.0g,

L-薄荷醇 3.0g

作為添加物,含有硬脂酸鈉、棕櫚酸、1,3-丁二醇、異丙醇及其他兩種成分。

#### 詳細資訊

經銷商	大鵬藥品工業股份有限公司
製造經銷商	三笠製藥股份有限公司
劑型	膏狀製劑
包裝單位	42gx1盒
製造商的建議零售價	2,024 日圓(不含稅1,840日圓)
JAN代碼	4987117372601
使用期限	3年

### 用法及用量

取適量擦拭患處,1日3~4次。但是,請勿用保護膜等通氣性差的物品覆蓋塗抹部位。此外,請勿聯用含有本成分的其他外用劑。

## [用法/用量相關注意事項]

- (1) 請嚴格遵照規定的用法用量。
- (2)本品並非用於治療引發疼痛和腫脹等的疾病,而是僅治療 疼痛和腫脹等症狀的藥品,因此僅限於在出現相關症狀時使用。
- (3) 本品僅限於外用,請勿內服。
- (4) 每周用量不得超過50g。
- (5)請注意避免本品進入眼睛。不慎入眼時,請立即用清水或溫水沖洗。另外,當症狀嚴重時,請接受眼科醫生診治。
- (6) 請勿在使用部位聯用其他外用劑。
- (7)請勿使用密封性差的物品(保護膜,矯正帶等)覆蓋或封住使用部位。
- (8) 請在擦除患處的汗漬後再開始使用。
- (9)請將容器內的藥品擠出4~5mm後再使用,避免容器直接碰觸患處。
- (10)當可以看見藥劑容器的底盤,且底盤上端露出時,請勿使 用本品。請勿隨意使用殘留在底盤上的藥劑。

# 療效或效果

關節痛,伴有肩酸的肩痛,腱鞘炎(手和手腕疼痛),肘部疼痛(網球肘等),肌肉疼痛,腰痛,跌打損傷,扭傷

## 使用注意事項

- 1. 有以下情形者,使用前請先向醫師、藥劑師或註冊經銷商諮詢。
  - (1) 正在接受醫師治療者
  - (2) 曾因藥物等產生過敏症狀者
  - (3) 正在服用以下藥品的人

新型喹諾酮類抗菌劑

2. 使用後出現以下症狀時,可能是產生副作用,請立刻停止使用,並持本說明書向醫師、藥劑師或註冊經銷商諮詢。

〔相關部位〕 〔症狀〕

皮膚: 發疹/發紅,發癢,皮膚紅腫,腫脹,疼痛,刺激感,熱感,皮

膚粗糙,脫屑(皮屑,皮脂等的皮膚脫落),水皰,色素沉澱

可能偶爾會出現以下嚴重症狀。此時請立刻接受醫師診治。

〔症狀名稱〕 〔症狀〕

休克(全身過敏性反應): 使用立刻出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音嘶啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼

吸困難、心悸、意識混濁等症狀。

接觸性皮膚炎、光線過敏症: 可致塗抹部伴有強烈瘙癢的發疹/發紅,腫脹,刺激感,水皰,

糜爛等劇烈的皮膚炎症狀和色素沉澱,白斑,其中發疹/發紅, 瘙癢等症狀可能遍布全身。而且,經過陽光照射的部位,症狀可

能出現或惡化。

3. 使用5~6日後症狀仍未改善時,請停止使用,並持本說明書向醫師、藥劑師或註冊經銷商諮詢。

#### 諮詢處

有關本藥劑的任問題,請聯絡購買的商店或以下方式與我們聯繫。

經銷商 聯絡方式 大鵬藥品工業株式會社 顧客諮詢室

郵遞區號 101-8444 東京都千代田區神田錦町 1-27

電話號碼 0120-4527-66

受理時間 9:00~17:00 (星期六、日、國定假日除外)

官網 https://www.taiho.co.jp/

#### 產銷商

三笠製藥株式會社