

〈参考〉ティーエスワンの副作用マネジメント

参考例



ティーエスワンを服用している方へ (家族の方もお読みください)

ティーエスワンを飲み始めてから、あなたに下記の症状があらわれた場合、がまんせずにティーエスワンをお休みしてください。

症状	1つでも当てはまった場合には、 ティーエスワンをお休みしてください	症状があらわれたときにお飲みください	
		お薬の名前	飲み方
下痢	水様便がでた	ロペラミド錠 (1mg)	1回1錠
食欲不振 吐き気、嘔吐	吐き気や嘔吐のため、 食事ができない	プロクロル パラジン錠 (5mg)	1回1錠 (4時間間隔)
発熱	38℃以上	解熱剤として アセトアミノフェン錠 (200mg)	1回2錠
		発熱したときから7日間 シプロフロキサシン錠 (200mg)	1回1錠 (1日3回、7日間)
口内炎	口内炎の痛みで 食事がしづらい		

※上記に該当しない場合でも、気になる症状があればティーエスワンをお休みしてください。

※ティーエスワンを飲んでいながらあらわれた症状は、治療日記に記入し、来院時に担当の医師や看護師、薬剤師に伝えましょう。



副作用を治療するお薬をもらったら、 メモしておきましょう

あなた用の副作用治療薬メモを作っておきましょう。つらい症状があらわれた時にあわてずにすみませう。

症状	1つでも当てはまった場合には、 ティーエスワンをお休みしてください	症状があらわれたときにお薬について	
		お薬の名前	飲み方
下痢	水様便がでた		
食欲不振 吐き気、嘔吐	吐き気や嘔吐のため、 食事ができない		
発熱	38℃以上		
口内炎	口内炎の痛みで 食事がしづらい		
その他*			

*上記以外の症状で治療薬やアドバイスを受けていたら、メモしておきましょう。